


CONSEILS À SUIVRE APRÈS UNE DÉVITALISATION



La dévitalisation, appelée **traitement endodontique** en langage technique, **consiste à retirer la pulpe** (nerfs et vaisseaux sanguins) **de la racine** puis à nettoyer et désinfecter la cavité avant de obturer avec une pâte inerte et antiseptique.

Après une dévitalisation, il est normal (mais pas systématique) de ressentir une gêne voire une douleur à la pression / mastication sur la dent traitée. Le plus souvent, cette douleur dure deux jours puis disparaît spontanément et peut être soulagée par la prise d'un antidouleur.

- Anti-douleur : Paracétamol 1 gr (max 4 gr par jour).

Si la douleur persiste ou est trop importante, la prise d'un anti-inflammatoire est conseillée.

- Anti-inflammatoire : Ibuprofen 400 mg (maximum 3 par jour si pas contre-indiqués).

Si la gencive ou la joue gonfle, contactez le dentiste afin de voir si une prise d'antibiotique est nécessaire. **Ne pas oublier de lui signaler toute allergie médicamenteuse.**

① Le dentiste vous aura averti s'il a posé une obturation provisoire (pansement) ou définitive sur la dent traitée. Si celle-ci est provisoire, il est nécessaire de la remplacer dans les 3 mois qui suivent votre traitement afin d'éviter des recontaminations de la racine traitée.

Si la douleur persiste encore après cela où qu'un gonflement apparaît, contactez le cabinet.

Bonne guérison !

